

DOSIS IMMUNOCAL EN NIÑOS

recomendación: Dr. Eduardo Schocoff

TIPO DE PACIENTE	DOSIS			PERÍODO	OBSERVACIONES
	Mañana	Mediodía	Noche		
Bebes prematuros (más de 2 kilos)	1/4 sobre			3 días	Puede mezclarlo con la leche pero nunca calentar
	1/4 sobre	1/4 sobre		Resto de días	
Hasta 1 año	1/2 sobre			3 días	Agregar a la nutrición del niño
	1/2 sobre	1/2 sobre		Resto de días	
1 a 6 años	1/2 sobre			3 días	Máximo 2 sobres en caso de leucemia, linfoma, en tratamiento quimioterapia
	1/2 sobre	1/2 sobre		3 días	
enfermos crónicos	1 sobre	1 sobre		Resto de días	
6 a 12	1/2 sobre			3 días	Hasta 3 sobres
	1/2 sobre	1/2 sobre		3 días	
	1 sobre	1 sobre		3 días	
	enfermos crónicos	1 sobre	1 sobre	1 sobre	
12 a 16 años	1/2 sobre			3 días	Hasta 4 sobres
	1/2 sobre	1/2 sobre		3 días	
	1 sobre	1 sobre		3 días	
	enfermos crónicos	1 sobre	1 sobre	1 sobre	

En caso de trastorno digestivo, se empieza más lentamente. En bebés 1/8 de sobre.
Al inicio, en lugar de subir la dosis a los 3 días, hacerlo después de una semana.

Tomarlo con zumo (jugo), yogurt líquido, agua

No existe la sobredosis